

# Sanierungsschema bei MRSA- Keimträgerschaft



## Screening-relevante MRSA-Risikofaktoren nach KRINKO

1. Patienten mit bekannter MRSA-Anamnese
2. Patienten aus Regionen / Einrichtungen mit bekannt hoher MRSA-Prävalenz
3. Patienten mit einem stationären Krankenhausaufenthalt (> 3 Tage) in den zurückliegenden 12 Monaten
4. Patienten die (beruflich) direkten Kontakt zu Tieren in der landwirtschaftlichen Tiermast haben
5. Patienten, die während eines stationären Aufenthalts Kontakt zu MRSA-Trägern hatten
6. Patienten mit zwei oder mehr der folgenden Risikofaktoren: Chronische Pflegebedürftigkeit; Antibiotikatherapie in den zurückliegenden 6 Monaten; liegende Katheter (z. B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde); Dialysepflichtigkeit; Hautulkus, Gangrän, chronische Wunden, tiefe Weichteilinfektionen

## Durchführung

Sanierungsbereich	Nasenvorhöfe	Mund- und Rachenraum	Ganzkörperwaschung von Haut und Haaren	Infizierte Wunden	Sonstiges
<b>Wirkstoffe</b>	Mupirocin Bacitracin Octenidin Polihexanid PVP-Jod	Chlorhexidin Polihexanid Octenidin Hexetidin	Chlorhexidin Polihexanid Octenidin Triclosan	Polihexanid Octenidin Silber PVP-Jod Biochirurgie	Tägl. Bekleidung, Textilien und Gegenstände, die mit Haut oder Schleimhaut Kontakt haben wechseln (Bettwäsche, Utensilien der Körperpflege - Handtücher, Waschlappen, Einmalkämme, Einmalzahnbürste, Einmalrasierer etc.)
<b>Tage</b>					
<b>1</b>	3x täglich	2-3x täglich	1x täglich	1-3x täglich	
<b>2</b>	3x täglich	2-3x täglich	1x täglich	1-3x täglich	
<b>3</b>	3x täglich	2-3x täglich	1x täglich	1-3x täglich	
<b>4</b>	3x täglich	2-3x täglich	1x täglich	1-3x täglich	
<b>5</b>	3x täglich	2-3x täglich	1x täglich	1-3x täglich	
<b>6</b>	Pause				
<b>7</b>	Pause				
<b>8</b>	Pause				
<b>9</b>	1. Kontrollabstrich				
<b>10</b>	2. Kontrollabstrich				
<b>11</b>	3. Kontrollabstrich				
	Ist der erste Abstrichzyklus (á 3 Kontrollabstiche) <b>negativ</b> = <b>Sanierung abgeschlossen</b> , es folgt der zweite Abstrichzyklus zwischen dem 3. und 6. Monat und abschließend folgt der dritte Abstrichzyklus nach 12 Monaten. Ist der erste Abstrichzyklus <b>positiv</b> = <b>neuer Sanierungszyklus!</b>				

Zusätzliche Informationen zur Sanierung bei MRSA finden Sie im Merkblatt *Informationen zur Sanierung und Umgebungsdekontamination einer MRSA Keimträgerschaft: Merkblatt für Patienten* auf der Homepage des MRE-Netzwerks unter [www.mre-netzwerk-bw.de](http://www.mre-netzwerk-bw.de).